

حمل کے دوران باقاعدہ اپائنمنٹس



مردہ پیدائش کا خطرہ کم کرنے میں مدد

حمل کے دوران باقاعدہ اپائنمنٹس پر جانا آپ کو اور آپ کے بچے کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ معائنے آپ کے بچے کی صحت اور نشوونما جانچنے میں مدد کرتے ہیں۔ آپ کسی بھی پریشانی کے بارے میں بات بھی کر سکتی ہیں اور یہ سیکھ سکتی ہیں کہ مردہ پیدائش کا خطرہ کیسے کم کیا جائے۔

مردہ پیدائش کا خطرہ کم کرنے میں مددگار طریقے

اپنے بچے کی پیدائش کے وقت کے بارے میں اپنے ہتلیتھ کیئر فراہم کنندہ سے بات کریں۔

۲۸ ہفتوں سے، کروٹ کے بل سوئیں۔

اپنے بچے کی حرکات سے واقف رہیں اور اگر ان میں تبدیلی آئے تو مدد حاصل کریں۔

تمباکو نوشی اور سگریٹ کے دھوئیں سے بچیں۔

آپ کی حمل کی اپائنٹمنٹس

ہر ہپلٹھ اپائنٹمنٹ پر، آپ کا ہپلٹھ کیئر فراہم کنندہ یہ کر سکتا ہے:



آپ کے بچے کی
حرکات پر بات کرنا



آپ کے بچے کے دل
کی دھڑکن چیک کرنا



آپ کے بچے کی
نشوونما ناپنا



آپ کی صحت اور
خیریت کا جائزہ لینا



آپ کا بلڈ پریشر ناپنا

اپنی پہلی اپائنٹمنٹ کے لیے اپنی ہپلٹھ سروس یا ڈاکٹر (GP) سے رابطہ کریں۔

حمل کے پہلے ۱۰ ہفتے

یہ اپائنٹمنٹ نسبتاً لمبی ہوگی۔ آپ توقع کر سکتی ہیں کہ:

اپنے حمل کے بارے میں بات کریں گی اور پیدائش کی متوقع تاریخ کا اندازہ لگایا جائے گا۔
اپنی صحت کی بھڑکی کے بارے میں بات کریں گی، جس میں ذہنی اور جذباتی صحت بھی شامل ہے۔
سپلیمنٹس اور ادویات پر بات ہوگی۔

آپ کا قد، وزن اور بلڈ پریشر ناپا جائے گا۔

خون اور پیشاب کے ٹیسٹوں کے لیے ریفرل ملے گا۔

جینیاتی (حیاتیاتی) اسکریننگ کے اختیارات پر بات ہوگی۔

آپ کے پہلے الٹراساؤنڈ (ultrasound) کے لیے ریفرل ملے گا۔

تمباکو نوشی، سگریٹ کے دھوئیں اور مدد حاصل کرنے کی جگہوں پر بات ہوگی۔

ویکسین:
آپ حمل کے کسی بھی مرحلے پر فلو
(influenza) کی ویکسین لگوا سکتی
ہیں۔

۱۹-۱۶ ہفتے

ابتدائی حمل کے نتائج پر بات کریں اور یہ کہ آیا صحت کے سپلیمنٹس کی ضرورت ہے۔

اپنے ۱۸-۲۰ ہفتے کے مورفولوجی اسکین (morphology scan) کا انتظام کریں۔

۲۰-۱۸ ہفتے

ویکسین:
۲۰-۳۲ ہفتوں کے دوران کسی بھی
وقت، آپ کالی کھانسی (whooping
cough) کی ویکسین لگوا سکتی ہیں۔

مورفولوجی اسکین (morphology scan) کروائیں۔ یہ ایک لمبا اور تفصیلی الٹراساؤنڈ ہے
جس میں آپ کے بچے کے اعضاء، نشوونما اور بڑھوتری کی جانچ کی جاتی ہے۔

۲۸-۲۷ مفتے

انجکشن:
تقریباً ۲۸ ہفتوں پر، آپ کے پہلے والے
خون کے ٹیسٹ کے مطابق، آپ کو
anti-D انجکشن کی ضرورت ہو سکتی
ہے۔

حمل کی ذیابیطس (خون میں شکر کی زیادتی) کا ٹیسٹ۔
(اگر ضرورت ہو تو) دیگر معمول کے خون کے ٹیسٹ کروائیں۔
۲۸ ہفتوں سے، کروٹ کے بل سوئیں۔

۳۶-۳۹ مفتے

ویکسین: ۲۸ اور ۳۶ ہفتوں کے درمیان
کسی بھی وقت، آپ RSV ویکسین لگوا
سکتی ہیں۔

اپنے ٹیسٹ کے نتائج پر بات کریں۔
نوٹ: اگر آپ پہلے anti-D انجکشن لگوا چکی ہیں، تو اس وقت آپ کو ایک اور انجکشن
لگے گا۔
اپنی پیدائش کے منصوبے (برتھ پلان) اور رد کم کرنے کے اختیارات پر بات کریں۔

۳۷-۳۵ مفتے

بچے کی پوزیشن چیک کی جائے گی اور یہ کہ بچہ آپ کے میزوس کتنا نیچے آگیا ہے۔
پیدائش کی معلومات، ذہنی صحت کی مدد، اپنے نئے بچے کی دیکھ بھال، اور دیگر معلومات پر بات ہوگی، جیسے نوزائیدہ بچے کی اسکریننگ
ٹیسٹوں کے متوقع نتائج اور آپ کے بچے کے لیے وٹامن K۔
ٹیسٹ: آپ کو گروپ بی اسٹروپنوکوکس (GBS) اسکریننگ ٹیسٹ کی پیشکش کی جا سکتی ہے۔ آپ کا ہیملتھ کیئر فراہم کنندہ آپ
کے وجہ جاننے کے نچلے حصے اور مقعر سے نمونہ (سواب) لے سکتا ہے۔ اگر ٹیسٹ مثبت آئے تو عام طور پر زچگی کے دوران بچے کی
حفاظت کے لیے آپ کو اینٹی بائیوٹکس دینے کی پیشکش کی جاتی ہے۔

۴۰-۳۸ مفتے

بچے کی پوزیشن چیک کی جائے گی اور یہ کہ بچہ آپ کے میزوس میں کتنا نیچے آگیا ہے۔
بچے کی پیدائش کے محفوظ ترین وقت پر بات کریں۔

۴۱ مفتے

اگر ابھی آپ کے ہاں بچے کی پیدائش نہیں ہوئی تو زچگی شروع کروانے کے اختیارات پر بات چیت۔

یہ باقاعدہ اپائنٹمنٹس ہیں، لیکن ضرورت پڑنے پر آپ کا ہیملتھ کیئر فراہم کنندہ اضافی اپائنٹمنٹس تجویز کر سکتا ہے۔

اگر اپائنٹمنٹس کے درمیان آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ اپنی ہیلتھ سروس سے رابطہ کر سکتی ہیں یا
Pregnancy, Birth and Baby Hotline کو ۱۸۰۰ ۸۸۲ ۳۳۶ پر کال کر سکتی ہیں۔



اگر آپ کو مہترجم کی ضرورت ہو تو اپائنٹمنٹس بک کرواتے وقت اپنے ہیلتھ کیئر فراہم کنندہ کو بتائیں۔



Australian Government
Department of Health,
Disability and Ageing

THE SOCIAL POLICY GROUP